

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

栄 衛（エキス顆粒）

（漢方製剤）

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- （1）医師の治療を受けている人。
- （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
- （3）胃腸が弱く下痢しやすい人。
- （4）今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

体力虚弱なものの次の諸症：病後・術後などの体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血

用法・用量

食間に水又はお湯にて服用

年齢	1回量	1日服用回数
成人	1包(2g)	3回
7歳以上 15歳未満	成人の2/3量	
4歳以上 7歳未満	成人の1/2量	
2歳以上 4歳未満	成人の1/3量	
2歳未満	成人の1/4量以下	

食間とは…
食後2～3時間を
指します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分・分量

本品3包(1包2.0g)中、下記生薬より製した水製エキス(乾燥エキスとして)1.4gを含有します。

トウキ	----- 2.0g	ジオウ	----- 2.0g
ビャクジュツ	----- 2.0g	ブクリョウ	----- 2.0g
ニンジン	----- 1.5g	ケイヒ	----- 1.25g
シャクヤク	----- 1.0g	チンピ	----- 1.0g
オウギ	----- 0.75g	オンジ	----- 0.75g
ゴミシ	----- 0.5g	カンゾウ	----- 0.5g

添加物として乳糖水和物及びバレイシヨテンブンを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで(土、日、祭日を除く)

製造販売元 たてばやししょうかくどう
株式会社 **建林松鶴堂**
〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7