

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

晃 勤 湯

（生薬製剤）

- ◆「晃勤湯」は肋間神経痛、胸痛の改善、去痰に10種類の生薬を配合して創りました弊社独自の製剤です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は服用しないこと

生後3カ月未満の乳児。



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- （1）医師の治療を受けている人。
- （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
- （3）高齢者。
- （4）今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- （5）次の症状のある人。 むくみ
- （6）次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

肋間神経痛、去痰、胸痛

用法・用量

本品1袋を煎じる容器（鉄製のものは使用しない）に入れ、水550mL（約3合）を加えて火に掛け、沸騰したら弱火にし、ふきこぼれないように気をつけながら約半量となるまで煎じ、成人1日量とし食間に服用します。

年齢	1回量	1日服用回数
成人	1日分の1/3量	3回
7歳以上 15歳以下	成人の1/2量	
4歳以上 7歳未満	成人の1/3量	
2歳以上 4歳未満	成人の1/6量	
2歳未満	成人の1/10量	

食間とは…
食後2～3時間を
指します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- （1）服用に際しては、人肌程度に温めて服用すること。
- （2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- （3）1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分・分量

本品1包（25.3g）中、下記生薬を含有します。

ハ ン ゲ	-----	6.0g	サ イ コ	-----	6.0g
オ ウ ゴ ン	-----	4.0g	ニ ン シ ン	-----	1.5g
タ イ ソ ウ	-----	1.5g	オ ウ レ ン	-----	1.2g
カ ン ソ ウ	-----	1.2g	シ ョ ウ キ ョ ウ	-----	1.2g
キ キ ョ ウ	-----	1.2g	カ ロ ニ ン	-----	1.5g

添加物は含有していません。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- （2）小児の手の届かない所に保管してください。
- （3）煎じた薬液は、冷蔵庫に保管してなるべく早めに服用してください。
- （4）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで（土、日、祭日を除く）

製造販売元 たてばやししょうかくどう

株式会社 **建林松鶴堂**

〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7