

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

よう せい せん  
**養 成 煎**

（胃腸薬）

- ◆「養成煎」は食欲減退、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、胸やけ、胸つかえ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐の改善、整腸（便秘を整える）に19種類の生薬を配合して創りました弊社独自の製剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- （1）医師の治療を受けている人。
- （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
- （3）今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

食欲減退、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、胸やけ、胸つかえ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、整腸（便秘を整える）

## 用法・用量

本品1包を煎じる容器（鉄製のものは使用しない）に入れ、水550mL（約3合）を加えて火に掛け、沸騰したら弱火にし、ふきこぼれないように気をつけながら約半量となるまで煎じ、成人1日量とし食間に服用します。

年齢	1回量	1日服用回数
成人	1日分の1/3量	3回
11歳以上15歳未満	成人の2/3量	
8歳以上11歳未満	成人の1/2量	
5歳以上8歳未満	成人の1/3量	
3歳以上5歳未満	成人の1/4量	
3歳未満	服用しないこと	

食間とは…  
食後2～3時間を  
指します。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- （1）服用に際しては、人肌程度に温めて服用すること。
- （2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## 成分・分量

本品1包（25.1g）中、下記生薬を含有します。

キシツ	----- 2.0g	コウボク	----- 2.0g	エンゴサク	----- 1.5g
ソウジュツ	----- 1.5g	チンピ	----- 1.0g	ニンジン	----- 1.0g
カンゾウ	----- 0.9g	ハツカ	----- 0.9g	ケイヒ	----- 0.4g
オウレン	----- 0.3g	シュクシャ	----- 0.3g	モッコウ	----- 0.3g
ヤクチ	----- 0.3g	ウバイ	----- 2.3g	ウヤク	----- 0.5g
サンザシ	----- 2.0g	シソシ	----- 2.0g	アカメガシワ	----- 5.0g
カンキョウ	----- 0.9g				

添加物は含有していません。

### 〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- （2）小児の手の届かない所に保管してください。
- （3）煎じた薬液は、冷蔵庫に保管してなるべく早めに服用してください。
- （4）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

## お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂      お客様相談室  
電話      03-3843-3833  
受付時間      9時から17時まで（土、日、祭日を除く）

製造販売元 たてばやししょうかくどう  
株式会社 **建林松鶴堂**  
〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7